

FLYPACK® COMPLETA

Piégeage de masse pour la lutte contre la mouche du brou, N° AMM: 2180691

Rhagoletis completa est un diptère originaire d'Amérique du Nord qui est entré en Europe à la fin des années 80, causant des dommages importants à son hôte principal : le noyer.

Les adultes émergent du sol de début Juillet à Septembre. Il y a une génération par an. L'accouplement a lieu 6 à 8 jours après émergence de l'insecte. Les femelles pondent, 1 à 2 semaines après, une quinzaine d'oeufs par fruit soit au total 300 à 400 oeufs par femelle. Les oeufs pondus éclosent en 4 à 7 jours en fonction des conditions climatiques. Les larves se développent dans le fruit en décomposition. Le sex-ratio de cette mouche est équilibré : 1 mâle pour 1 femelle.

Le cycle larvaire est de 3 à 5 semaines dépendant de la température. Les larves se laissent tomber au sol puis s'enterrent de quelques centimètres et se transforment en pupes. L'été suivant, la majorité des adultes émergent du sol et répètent ce cycle, tandis qu'une partie des pupes passent une ou deux saisons en diapause.



Mouche du brou
Rhagoletis completa



MÉTHODES DE LUTTE

Le contrôle de la mouche du noyer a été réalisé par l'application d'insecticides de contact sur l'ensemble de l'arbre ou par des traitements partiels avec un mélange d'insecticide et d'attractifs alimentaires. Cette technique consiste à attirer les adultes à l'intérieur d'un piège avec un attractif, où l'insecte meurt au contact d'un insecticide.

FORMULATION

Piégeage de masse

Pièges dont le couvercle est imprégné sur la face inférieure de 0,015g de deltaméthrine, et comportant un diffuseur attractif alimentaire.

APPLICATION

- Le nombre de pièges recommandé est de 100 pièges/ha.
- Les pièges doivent être suspendus à une branche dans le tiers supérieur des arbres.
- Les pièges doivent être distribués de façon homogène et alternée.
- Les pièges et les diffuseurs doivent être placés avant le début du premier vol des adultes et jusqu'à la récolte
- La durée de diffusion est de 150 jours, une seule application par an est nécessaire.
- En cas de forte infestation, il est recommandé de compléter le piégeage massif avec un programme phytosanitaire (adulticide et/ou barrière minérale).



PLAN DE POSE:

1. Estimer la distance entre deux pièges afin de positionner 100 pièges/ha
 2. Commencer la pose des pièges par les deux rangs en extrémité et finir par l'intérieur du verger en posant les pièges en quinconce sur tous les rangs de bordure.
 3. Les pièges doivent être suspendus à une branche dans le tiers supérieur des arbres.
 4. Surface minimale de 5.000 m²
-

MANIPULATION & STOCKAGE

FLYPACK® COMPLETA est fourni en cartons de 20 pièges. Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine, sans l'ouvrir, jusqu'au moment de son utilisation, de préférence dans un endroit frais. Ne pas couper, ouvrir ou perforer les diffuseurs.

www.sedq.es

comercial@sedq.es