
PRAYSLAB

Utilisation pour surveiller la teigne de l'olivier,
Prays oleae

La teigne de l'olivier est le deuxième ravageur le plus important des oliveraies méditerranéennes, causant des dégâts importants à la production d'olives.

P. oleae est un petit lépidoptère de 6 mm de long qui s'attaque essentiellement aux cultures d'oliviers.

Générations: Il y a trois générations par an, chacune s'attaquant à différentes parties de l'arbre, inflorescence, fleur et fruit .

Dégâts: Les larves de la première génération (philophages) attaquent les feuilles et les bourgeons tandis que celles de la seconde attaquent les fleurs (anthophages). Enfin, celles de la troisième consomment les fruits (carpophages). Les dégâts provoqués par cette troisième génération sont les plus graves car provoquent la chute des fruits.



Tigne de l'olivier
Prays oleae

MÉTHODES DE LUTTE

Phéromone sexuelle pour le suivi du vol.



FORMULATION

Diffuseur

Emballage: 3 capsules par sachet

Piège DELTA avec fond collé: Selon demande

Durée: 45-50 jours (phéromone)



APPLICATION

Placement de : 3 pièges / ha

1 unité par piège delta.

Très important, ne pas ouvrir le diffuseur, même dans la piège

MANIPULATION & STOCKAGE

Congélateur pendant 2 ans à compter de la date de fabrication.