

WEINTEC

Confusion sexuelle pour la lutte contre
Eudémis et Cochylis, N° AMM: 2210421

WEINTEC est utilisé dans les pays viticoles les plus importants d'Europe. De nombreuses études d'efficacité réalisées ces dernières années confirment l'efficacité du produit.

Eudémis (*Lobesia botrana*) présente généralement trois générations par an. Les dégâts les plus importants sont produits par les larves de la deuxième et de la troisième génération.

Cochylis (*Eupoecilia ambiguella*) présente généralement deux générations par an. La première génération apparaît en avril-mai et la seconde en juin-juillet. Les femelles de la première génération pondent des œufs isolément sur des boutons floraux des fleurs ou des pédicelles.



Eudémis de la vigne
Lobesia botrana

MÉTHODES DE LUTTE


Actuellement, le seul type de traitement existant pour cette espèce est chimique. Cependant, ces solutions chimiques sont peu nombreuses et peu efficaces. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser la confusion sexuelle comme méthode alternative de lutte. Cette technique consiste à créer une atmosphère saturée en phéromone sexuelle de l'insecte à contrôler, afin de perturber les mâles, de façon à ce qu'ils ne localisent pas les femelles en évitant ainsi les accouplements.



FORMULATION

Confusion sexuelle

Diffuseur passif (formulation VP) contenant 210 mg de l'acétate de (E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl et 325 mg de (Z)-9-dodécen-1-yl acétate, composés majeurs de la phéromone sexuelle de *Lobesia botrana* et *Eupoecilia ambiguella*.



APPLICATION

- Les diffuseurs doivent être placés sur le terrain quelques jours avant le début du vol des adultes de première génération.
- Chaque diffuseur doit être placé dans le tiers supérieur de la vigne ou directement sur le fil de fer dans le cas des cultures palissées.
- La quantité recommandée de diffuseurs est de 400 unités par hectare, en renforçant les bords.
- Il est nécessaire de surveiller le vol du ravageur en plaçant 1 à 2 pièges delta par hectare avec le diffuseur de surveillance correspondant. Les pièges de surveillance aideront à détecter la présence de l'insecte et à déterminer le moment approprié pour effectuer une surveillance de la population de pontes et de dommages. En



fonction du seuil économique de dommage établi, envisager l'application d'un traitement complémentaire.

- La durée des diffuseurs est de 180 jours dans des conditions normales.
 - Pas de période de réentrée dans la parcelle
-

MANIPULATION & STOCKAGE

WEINTEC est livré en sachet de 200 diffuseurs (1/2 ha). Les emballages sont imperméables aux faibles quantités de vapeur pouvant être émises pendant le stockage. Les diffuseurs doivent être conservés dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. Les diffuseurs non utilisés doivent être conservés dans des récipients hermétiquement fermés à une température ne dépassant pas 8 °C (réfrigérateur ou de préférence congélateur à -18 °C). Dans ces conditions, le produit peut être conservé jusqu'à 2 ans à compter de la date de fabrication et mis sur le terrain pour une durée de 180 jours.

www.sedq.es

comercial@sedq.es