ZEULAB

Utilisation pour la surveillance du zeuzère du poirier, *Zeuzera pyrina*

Le "zeuzère du poirier", *Zeuzera pyrina*, est un insecte polyphage qui attaque une grande variété d'espèces, avec une incidence particulière sur les arbres fruitiers tels que le poirier, le pommier, le cerisier, l'olivier et le noisetier.



Zeuzera pyrina
Lepidoptera: Cossidae

Dommages : variables selon l'âge de la plantation. Ainsi, chez les jeunes arbres, une seule chenille peut causer la mort de l'arbre ou empêcher une formation correcte de la structure des branches. Les arbres plus âgés sont très attaqués, ce qui entraîne un dessèchement des branches les rendant plus vulnérables aux actions du vent et aux attaques d'autres ravageurs.
Cycle biologique : Les premiers adultes apparaissent à la fin du printemps et émergent tout au long de l'été, les adultes étant observés jusqu'en septembre. Les femelles pondent leurs œufs dans d'anciennes galeries larvaires ou sous l'écorce. Elles peuvent pondre plus de 1000 œufs au cours de leur vie. Après l'éclosion, les chenilles creusent des galeries ascendantes, migrent vers l'extérieur et pénètrent à nouveau à l'intérieur des branches vers des parties plus épaisses. Elles passent l'hiver à l'état de chenille.
Générations : généralement une génération par an, mais dans les zones froides, le cycle biologique peut être complété en deux ans.



MÉTHODES DE LUTTE

Dans la détection et le suivi des ravageurs utilisant des phéromones sexuelles, il est possible de connaître la distribution et la densité de la population des insectes nuisibles.
Le suivi est utile pour prédire le moment de l'émergence des adultes, ce qui permet d'établir des seuils de capture pour l'adoption de mesures de contrôle complémentaires.

FORMULATION

Capsule

Le produit ZEULAB est un flacon cylindrique fermé contenant une phéromone sexuelle pour le suivi du vol de Z. pyrina.
Le matériau du diffuseur est perméable aux vapeurs, permettant ainsi l'émission du produit à une vitesse contrôlée.
La durée d'émission de ZEULAB est de 60 jours. Remplacez la capsule par une nouvelle une fois ce délai écoulé.

APPLICATION

Para la colocación:

- Placez 3 pièges par hectare
- Placez 1 capsule par piège delta.
- Important : ne pas ouvrir le flacon.

MANIPULATION & STOCKAGE

Stockez dans un réfrigérateur ou un congélateur pendant 2 ans à compter de la date de fabrication.

www.sedq.es

comercial@sedq.es