

AOLAB

Uso en el monitoreo del piojo rojo de California, *Aonidiella aurantii*

Es un hemíptero diaspino considerado una de las principales plagas de cítricos en España.

Ciclo biológico: Las ninfas móviles, una vez se adhieren a la planta, desarrollan una cubierta cerosa blanca sobre sus cuerpos. Las hembras tienen un escudo circular, mientras que el de los machos adultos poseen alas y son los que somos capaces de monitorear mediante feromonas.

Daño: La aparición de escudos en los frutos resulta en pérdidas debido al aspecto deteriorado, aunque no afecte el sabor ni otras cualidades del fruto.



Piojo rojo de California

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Ésto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.



FORMULACIÓN

Séptum

El producto AOLAB es un séptum con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *A. aurantii*.

La duración de la emisión de AOLAB es de **60 días** (8-9 semanas).



APLICACIÓN

Colocación de: 3 lamina pegajosa blanca / ha.

1 septum por lamina pegajosa.

Muy importante, no abrir el vial.



MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.