

# COCCILAB

Uso en el monitoreo la cochinilla algodonosa de la vid, *Planococcus ficus*


Insectos de la familia Pseudococcidae, que generan graves daños en viña y es transmisor de numerosos virus patógenos.

Las hembras son más grandes, sin alas y cubiertas de cera, mientras que los machos son muy pequeños, alados y carecen de piezas bucales funcionales.

**Ciclo biológico:** Pasan los meses de invierno en colonias en las partes inferiores de la planta, debajo de la corteza o bajo tierra en las raíces. Durante los meses de primavera y verano, se mueven hacia arriba en la planta. Sin embargo, la mayor parte vive dentro del tronco de la planta durante todo el año.

Se reproduce rápidamente, con hembras que pueden producir entre 50 y 800 crías. Los huevos se desarrollan en ovisacos algodonosos, ubicados en la planta huésped o bajo tierra.

**Daños:** La alimentación directa de las cochinillas en el tejido vegetal debilita la planta, provocando defoliación y plasmólisis. La secreción de "melaza" durante la digestión también causa daños indirectos. De esta forma, se da una disminución de la calidad tanto del mosto como del vino.



**Cochinilla  
algodonosa de la  
vid**  
*Planococcus ficus*



## PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Ésto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.

## FORMULACIÓN

El producto COCCILAB es un séptum con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *P.ficus*.

La duración de la emisión de COCCILAB es de **50-60 días** (8- 9 semanas).

## APLICACIÓN

Colocación de: 3 lamina pegajosa blanca o trampa delta/ ha.

1 septum por lamina pegajosa.

Muy importante, no abrir el vial.



## MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.



**[www.sedq.es](http://www.sedq.es)**

[comercial@sedq.es](mailto:comercial@sedq.es)