CYDIALAB

Uso para monitoreo de la Carpocapsa, *Cydia pomonella*

La Carpocapsa, en la actualidad, constituye la principal plaga de algunos cultivos importantes como son: el manzano, el peral, el nogal y el membrillero.

La carpocapsa tiene de media 3 generaciones al año. Los vuelos de adultos empiezan a partir de la segunda quincena de abril. La primera y segunda generación ocurre en los meses de abril a junio y la tercera generación en julio o agosto. Las larvas recién nacidas son de color blanquecino, con la cabeza negra y pueden desplazarse con rapidez hacia el fruto. Una vez en el fruto se alimentan de él dañándolos de forma irreversible.



Carpocapsa
Cydia pomonella

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Ésto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.

FORMULACIÓN


Difusor

El producto CYDIALAB es un vial cilíndrico cerrado con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *C. pomonella.*
El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.
La duración de la emisión de CYDIALAB es de 60 días. Reponer la capsula por una nueva una vez pasado este tiempo.



APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha
1 capsula por trampa delta.
Muy importante, no abrir el vial.



MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.

www.sedq.es
comercial@sedq.es