# GORTYLAB

## Uso en el monitoreo del barrenador de la alcachofa, *Gortyna xanthenes*

*Gortyna xanthenes* es la plaga más dañina para el cultivo de alcachofa, ya que su ataque debilita el crecimiento de las plantas y dificulta la regeneración de los brotes afectados.



**Descripción:** es un lepidóptero noctuido de 40-50 mm de envergadura que ataca el cultivo de la alcachofa.
**Número de generaciones anuales:** presenta una sola generación, de septiembre hasta finales de noviembre/principios de diciembre.
**Daño:** los daños son ocasionados por las larvas que penetran, tras mordisquear las hojas, por las nerviaciones de las mismas, realizando posteriormente galerías hasta llegar al tallo. También pueden atacar las inflorescencias. Las plantas atacadas pierden vigor, incluso pueden llegar a morir, produciendo una merma en la producción.



### PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Ésto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.



### FORMULACIÓN

**Septum**

El producto GORTYLAB es un séptum con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *Gortyna xanthenes.*
El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.
La duración de la emisión de GORTYLAB es de **60 días**.

### APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha
1 unidad por trampa funnel.
Muy importante, no abrir el vial.

### MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.

**www.sedq.es**
comercial@sedq.es