OSTRILAB

Uso en el monitoreo del piral del maíz, *Ostrinia nubilalis*

El piral del maíz (Lepidoptera: Crambidae) es una plaga de los cereales, especialmente del maíz, originaria de Europa.



Ostrinia nubilalis

Descripción: especie de lepidóptero de 20-35 mm de envergadura que ataca gran variedad de cereales, con preferencia por el maíz, así como otros cultivos como pimiento.
Generaciones: presenta de 1-6 generaciones al año dependiendo de la zona geográfica.
Daño: las larvas perforan los tallos y las mazorcas para alimentarse, afectando de este modo al desarrollo y producción de la planta.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL



El uso de feromonas en la detección y monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una evaluación temprana en los cultivos. Esta información ayuda a predecir la emergencia de adultos y establecer umbrales de captura para implementar medidas de control sin dañar el ambiente.

FORMULACIÓN



Septum

El producto OSTRILAB es un septum con feromona sexual para seguimiento de vuelo de O. *nubilalis.*
La duración de la emisión de OSTRILAB es de **60 días** (8-9 semanas).

APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas delta/ ha a 1 - 1.2 metro del suelo.
1 septum por trampa delta.

MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.

www.sedq.es
comercial@sedq.es