

PINGUILAB

Uso para monitoreo del agusanado del olivo,
Euzophera pinguis

El agusanado del olivo es un lepidóptero que genera galerías en ramas y tronco considerado hasta hace poco plaga secundaria en olivares del mediterráneo.

Ciclo biológico: posee dos generaciones al año que se solapan, por lo que es posible encontrar larvas durante todo el año. La primera generación emerge en primavera, desde abril hasta junio, mientras que la segunda generación aparece en otoño, desde agosto hasta finales de septiembre.

Daños: las larvas excavan galerías provocando la sequedad de la rama afectada por encima de la galería. Los síntomas iniciales incluyen la aparición de hojas amarillentas o cloróticas en el árbol, seguidas de una defoliación intensa de las ramas afectadas.



Euzophera pinguis

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en la detección y monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una evaluación temprana en los cultivos. Esta información ayuda a predecir la emergencia de adultos y establecer umbrales de captura para implementar medidas de control sin dañar el ambiente.



FORMULACIÓN

El producto PINGUILAB es una cápsula con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *E. pinguis*.

El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.

La duración de la emisión de PINGUILAB es de 60 días (8-9 semanas).



APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha
1 septum por trampa funnel.

MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.



www.sedq.es
comercial@sedq.es