
PLUTELAB

Uso en el monitoreo de polilla de la col,
Plutella xylostella

Se trata de una plaga de la familia Plutellidae y se ha convertido en la plaga más destructiva de cosechas de plantas alimentarias de la familia Brassicaceae, como la colza, el repollo, la coliflor o el brócoli.

Especie de lepidóptero de 8-10 mm de longitud con una distribución global. Ataca a varias especies de crucíferas tanto cultivadas como silvestres, tales como la col, el brócoli, la col de Bruselas y la coliflor.

Generaciones: presenta varias generaciones al año, entre 5 y 10 dependiendo de la climatología.

Daño: las larvas se alimentan de las hojas, alimentándose debajo de las mismas sin tocar las venas. Las heridas ocasionadas pueden ser vía de entrada de otros patógenos.



Plutella xylostella

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Esto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.



FORMULACIÓN

Septum

El producto PLUTELAB es un séptum con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *P. xylostella*.

El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.

La duración de la emisión de PLUTELAB es de **45-50 días** (7 semanas).

APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha

1 séptum por trampa delta.

Muy importante, no abrir el vial.

MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.

www.sedq.es

comercial@sedq.es