
TECIALAB

Uso para monitoreo de la polilla
guatemalteca, *Tecia solanivora*

Considerada una de la plagas más graves de la patata en América Central y Sudamérica. Recientemente ha llegado a Islas Canarias, Galicia y Asturias, produciendo daños en tubérculos escavando galerías. Está considerada como organismo nocivo de cuarentena en la Unión Europea.

El adulto hace la puesta en la base de las plantas de patata o directamente en los tubérculos que no están enterrados a profundidad suficiente. La larva penetra en el tubérculo para alimentarse provocando la presencia de galerías, que ocasionan importantes daños en el cultivo y en el almacén. Las galerías sirven de entrada a otros patógenos, y a la producción de excrementos de la larva, y hacen que la patata no se pueda comercializar.



Tecia solanivora
Lepidoptera:
Gelechiidae

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El uso de feromonas en el monitoreo de plagas permite conocer su distribución y densidad poblacional, facilitando una detección temprana en los cultivos. Ésto permite establecer umbrales de capturas para implementar medidas de control.



FORMULACIÓN

El producto TECIALAB es una cápsula con feromona sexual para seguimiento de vuelo de *T. solanivora*.

El material del difusor es permeable a los vapores, permitiendo así la emisión del producto a una velocidad controlada.

La duración de la emisión de TECIALAB es de 60 días (8-9 semanas).



APLICACIÓN

Colocación de: 3 trampas / ha

1 capsula por trampa delta.

Muy importante, no abrir el vial.

MANEJO Y ALMACENAJE

Nevera o congelador por 2 años desde la fecha de fabricación.